



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

លេខ: ១៤៣ អនក្រ.បក

អនុក្រឹត្យ

ស្តីពី

ការកំណត់ប្រភេទផល ផលិតផលជលផលដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់

រាជរដ្ឋាភិបាល

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៥០៦/០១១ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦ ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពី ផលជល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០០ ស្តីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ៧៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការប្តូរឈ្មោះនាយកដ្ឋានផលជល ទៅជារដ្ឋបាលផលជល
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ១៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការកែសម្រួលអត្តនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងទៅជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ការដោះស្រាយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ រដ្ឋបាលផលជលឱ្យមានថ្នាក់ស្មើអគ្គនាយកដ្ឋាន ការដោះស្រាយកង្វះខាតក្រសួងស្រោច និងកែលម្អដីកសិកម្មឱ្យបាន



អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម និងកែសម្រួលអគ្គនាយកដ្ឋានច្បាប់កៅស៊ូនៅជាអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ ស្ថិតនៅ
ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

- បានទទួលការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩
សម្រេច

ជំពូកទី១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា១._

អនុក្រឹត្យនេះ កំណត់អំពីប្រភេទផល ផលិតផលផលិតផលទឹកសាបនិងសមុទ្រដែលមានប្រភពចេញពីធនធាន
ផលិតផលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីការពារ គ្រប់គ្រង និងអភិរក្សឱ្យមាននិរន្តរភាព ស្រប
តាមច្បាប់ស្តីពីផលិតផល ។


ជំពូកទី២

ចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទធនធានផលិតផលដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់

មាត្រា២._

ប្រភេទធនធានផលិតផល ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាបីក្រុមទៅតាមលក្ខខណ្ឌនិងស្ថានភាពនៃ
ភាពកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ខាងក្រោម ៖

១. ក្រុមប្រភេទជិតផុតពូជ : ជាប្រភេទធនធានផលិតផលទាំងឡាយនៅក្នុងធម្មជាតិកំពុងរងគ្រោះ
ថ្នាក់ ដែលចំពោះមុខផលស្តុកក្រុមប្រភេទនេះកំពុងប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអាច
វិនាសផុតពូជទាំងស្រុងនៅក្នុងធម្មជាតិនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ ដោយបរិមាណសរុបបាន
ថយចុះយ៉ាងតិច៨០ (ប៉ែតសិប) ភាគរយ ក្នុងរយៈពេល១០ (ដប់) ឆ្នាំ ចុងក្រោយឬក្នុង
រយៈពេលបីជំនាន់តំណពូជកន្លងមក តាមរយៈការអង្កេត ការប៉ាន់ប្រមាណ ឬ ការសន្និដ្ឋាន ។
២. ក្រុមប្រភេទកំពុងរងគ្រោះ : ជាប្រភេទធនធានផលិតផលទាំងឡាយនៅក្នុងធម្មជាតិកំពុងរង
គ្រោះថ្នាក់ ដែលមានភស្តុតាងបង្ហាញច្បាស់ថា ក្រុមប្រភេទនេះកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់
ដ៏ខ្លាំង ហើយអាចវិនាសផុតពូជនៅក្នុងធម្មជាតិនាពេលអនាគតមិនយូរប៉ុន្មាន ដោយបរិមាណ
សរុបបានថយចុះយ៉ាងតិច៥០ (ហាសិប) ភាគរយ ក្នុងរយៈពេល១០ (ដប់) ឆ្នាំ ចុងក្រោយ ឬ
ក្នុងរយៈពេលបីជំនាន់តំណពូជកន្លងមក តាមរយៈការអង្កេត ការប៉ាន់ប្រមាណ ការសន្និដ្ឋាន ឬ
ការរំពឹងទុក ។
៣. ក្រុមប្រភេទងាយរងគ្រោះ : ជាប្រភេទធនធានផលិតផលទាំងឡាយនៅក្នុងធម្មជាតិកំពុងរង
គ្រោះ ដែលងាយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ខ្លាំង ហើយអាចវិនាសផុតពូជនៅក្នុងធម្មជាតិនាពេល
អនាគតខាងមុខ ដោយបរិមាណសរុបបានថយចុះយ៉ាងតិច២០ (ម្ភៃ) ភាគរយ ក្នុងរយៈពេល១០ (ដប់) ឆ្នាំ ចុងក្រោយ ឬ
ក្នុងរយៈពេលបីជំនាន់តំណពូជកន្លងមក តាមរយៈការអង្កេត ការប៉ាន់ប្រមាណ ការសន្និដ្ឋាន ឬ
ការរំពឹងទុក ។



១០ (ដប់) ឆ្នាំចុងក្រោយប្រយៈពេលបីជំនាន់តំណពូជកន្លងមក តាមរយៈការអង្កេត ការប៉ាន់ប្រមាណ ការសន្និដ្ឋានឬការរំពឹងទុក ។

មាត្រា ៣._

ចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទធនធានជលផលមានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃអនុក្រឹត្យនេះ ។

មាត្រា ៤._

ការកែសម្រួល និងការកំណត់បន្ថែមអំពីប្រភេទធនធានជលផលដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ទៅអនាគត ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ ។

វិធានការការពារប្រភេទធនធានជលផល ដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ ត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ។

**ជំពូកទី ៣
អវសានប្បញ្ញត្តិ**

មាត្រា ៥._

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវទុកជានិរាករណ៍ ។

មាត្រា ៦._

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន អភិបាលរាជធានី ខេត្តពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៩







សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន





កន្លែងទទួល៖





- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
- អគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាល
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ដូចមាត្រា ៦
- រាជកិច្ច ✓
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ





ឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយអនុក្រឹត្យលេខ ១២៧.រន.បក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការកំណត់ប្រភេទធន ផលិតផលដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់
ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងសត្វលាស់ដល់សត្វតូចៗនៃប្រទេសកម្ពុជា


ល.រ	រូបភាព	ឈ្មោះក្នុងស្រុក	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	ឈ្មោះជាជាតិស្រុក	ឧបសម្ព័ន្ធ សាធារណៈ	ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
ក្រុមប្រភេទត្រីស្រទត						
១		ត្រីតាត ឬ ត្រីនាគ	<i>Scleropages formosus</i>	Asian bonytongue	I	<ul style="list-style-type: none">- រស់ និងរក្សាទុកនៅតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួននៃតំបន់ស្ទឹងត្រែងប៉ុណ្ណោះតាមតំបន់ស្ទឹងត្រែង- ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងត្រែងតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួននៃតំបន់ស្ទឹងត្រែង- អាចរកបាននៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងត្រែង- តំបន់ស្ទឹងត្រែង ២០-៥០ គ្រាប់ ប៉ុណ្ណោះតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួននៃតំបន់ស្ទឹងត្រែង- ប្រវែងរស់បានដល់ ៩០ ស.ម
២		ត្រីដ៏	<i>Pristis microdon</i>	Sawfish	I	<ul style="list-style-type: none">- ជាប្រភេទត្រីស្រទតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងត្រែង- មានកាយ និងតំបន់ស្ទឹងត្រែងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងត្រែង- ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងត្រែងតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួននៃតំបន់ស្ទឹងត្រែង- រស់នៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងត្រែងតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួននៃតំបន់ស្ទឹងត្រែង- ប្រវែងរស់បានដល់ ២០០ ស.ម
៣		ត្រីប៊ីកណ្តាត ឬ ត្រីខ្មៅ	<i>Puntius partipentazona</i>	Tiger barb		<ul style="list-style-type: none">- រស់នៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងត្រែងតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួននៃតំបន់ស្ទឹងត្រែង- មានកាយ និងតំបន់ស្ទឹងត្រែងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងត្រែង- ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងត្រែងតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួននៃតំបន់ស្ទឹងត្រែង- រស់នៅក្នុងតំបន់ស្ទឹងត្រែងតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួននៃតំបន់ស្ទឹងត្រែង- ប្រវែងរស់បានដល់ ២០០ ស.ម







						<p>ជាប់នឹងរុក្ខជាតិ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ប្រវែងវែងបំផុត ៥ ស.ម ។ - រស់តាមទន្លេ និងព្រៃឈើទឹកបឹងទន្លេសាប - ស៊ីពូកក្តាម កំពឹស រុក្ខជាតិផ្លែឆ្មារ និងសត្វល្អិត - ប្រវែង ៣៥ ស.ម អាចបន្តពូជបាន ហើយបន្តពូជនៅពេលទឹកដំឡើង ក្នុងនាមព្រៃឈើទឹក - ប្រវែងវែងបំផុត ៤០ ស.ម ។
៤		ត្រីក្បែកស្រង	<i>Balaniocheilos melanopterus</i>	Bala shakminnow		<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅស្រទាប់ទឹកពីកណ្តាលដល់ឆ្នេរ - បម្រាស់ទទួលក្នុងនាមព្រៃឈើទឹកពេលទឹកឡើងខ្ពស់ និងត្រឡប់ចូលបឹងទន្លេសាបវិញនៅខែតុលា - ស៊ីស្លឹក រុក្ខជាតិ និងសត្វល្អិតជាអាហារ - បន្តពូជក្នុងនាមព្រៃឈើទឹកពេលទឹកដំឡើង - ប្រវែងវែងបំផុត ៣៥ ស.ម ។
៥		ត្រីតង្រា	<i>Puntiplices bulu</i>			<ul style="list-style-type: none"> - រស់ និងបន្តពូជនៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេ ចាប់ពីព្រំប្រទល់ប្រទេសឡាវ រហូតដល់ទីមេឌូត្រាបេ ជួនកាលវាបែកតាមចាប់ពីទីវាលរហូតដល់ខេត្តកំពង់ចាម និងកណ្តាល - ចំណីរបស់វាគឺពូកត្រីគ្រប់ប្រភេទ និងកំពឹស - ជាប្រភេទចិញ្ចឹមកូននឹងទឹកដោះ ហើយអាចបន្តពូជចាប់ពីអាយុ ៧ ឆ្នាំ ដោយកូនម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ ២ ឆ្នាំ ម៉ែងទើបនឹងកើតឆ្នើមពី ១០ ទៅ ១២ គ.ក្រ - ហើយម៉ែងនឹងរស់រមាប្រហែល ១៣០ គ.ក្រ - អាយុកាលអតិបរមាប្រមាណ ៣០ ឆ្នាំ ។
៦		ត្រីក្បាលត្រឡាក់	<i>Orcella brevirostris</i>	Irrawaddy dolphin		





៧		ត្រីកាង	<i>Pangasianodon gigas</i>	Mekong giant catfish	1	<ul style="list-style-type: none"> - ជាប្រភេទសត្វល្អិតបំផុត មានប្រវែងដល់ ៣០០ ស.ម - បង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជន ពិសេស ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ - បង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជន ពិសេស ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ - បង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជន ពិសេស ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍
៨		ត្រីកង្កែប	<i>Callocarpic siamensis</i>	Giant barb		<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតាមដងទន្លេធំៗ និងតាមដងទន្លេតូចៗ - ជាប្រភេទត្រីមានទំហំធំ រហូតដល់ ២០០ ស.ម និងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជន ពិសេស ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ - បង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជន ពិសេស ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍
៩		ត្រីកង្កែប	<i>Probarbus jullieni</i>	Isok barb		<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតាមដងទន្លេធំៗ និងតាមដងទន្លេតូចៗ - ជាប្រភេទត្រីមានទំហំធំ រហូតដល់ ២០០ ស.ម និងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជន ពិសេស ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ - បង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជន ពិសេស ការបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍ និងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍





១០		ត្រីគ្រួសក់	<i>Probarbus labearmajor</i>	Thicklip barb		<ul style="list-style-type: none"> - រស់ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលើ និងដៃទន្លេធំៗដែលមានផ្លូវទៅទ្រទ្រង់បាត ពិសេសក្នុងទន្លេស្រក្នុង - វាស្ថិតក្នុងស្រទាប់បាត និងសត្វល្អិត - រដូវកាលស្រទាប់បាតនឹងមានការខ្វះខាត ដល់កុម្មៈ ហើយក្នុងករណីនេះវាអាចរស់នៅបានរយៈពេលខ្លីជាងធម្មតា - ប្រវែងរាងបំផុត ១៥០ ស.ម
១១		ត្រីគ្រួសកំស	<i>Probarbus labearminor</i>	Thinlip barb		<ul style="list-style-type: none"> - រស់ក្នុងទន្លេធំៗ និងអាងទន្លេមេគង្គលើ ប៉ុន្តែវាបានរស់នៅក្នុងទន្លេស្រទាប់បាត - វាស្ថិតក្នុងស្រទាប់បាត និងសត្វល្អិត - រដូវកាលស្រទាប់បាតនឹងមានការខ្វះខាត ដល់កុម្មៈ - ប្រវែងរាងបំផុត ៧០ ស.ម
១២		អណ្តើកប្លង់ ឬសរសៃ	<i>Balagur baska</i>	Mangrove tetrapin or estuarine tetrapin	I	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតាមរន្ធខ្យង តំបន់ប្រកបដោយទឹកស្អាត ឬ ទឹកសាប - ពិសេសនៅតាមពាយ - ស្ថានភាព (ស្និតស្នើ) ស្មៅ ផ្លូវកាងកាង និងរុក្ខជាតិនៅមាត់ទឹក និងពពួកខ្យងខ្យោ - បន្តពូជនៅពេលដែលវា ដល់តុលា នៅតំបន់ទឹកជ្រៅហើយយំលាក់ពេលដែលវា ដល់តុលាខ្យង ដោយពេញចិត្ត ១៤ ទៅ ២០ ក្រាប្រាំដង ។
ក្រុមប្រភេទចម្បងនេះ						
១៣		ត្រីត្រៀមដើរ	<i>Osphronemus exodon</i>	Elephant ear gourami		<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតំបន់ទឹកស្អាតតិចៗ និងទឹកស្អាត ដែលមានរុក្ខជាតិលិចលើទឹក ពិសេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនៃខេត្តក្រចេះ និងស្ទឹងត្រែង ហើយរស់នៅជាតូ










					<ul style="list-style-type: none"> - ស៊ីស្លូ និងពពួកក្របីតិលីចនីក - ពងកូនឆ្មារខ្មៅមីនា ដល់មេសា ហើយអាចដាក់កូនម្តងទៀតពីខែសីហា ដល់តុលា - ប្រវែងវែងបំផុត ៦០ ស.ម ។
១៤		ត្រីមាស	<i>Osphronemus goramy</i>	Giant gourami	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គលើ ចាប់ពីស្វាយរៀង ដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងមានជួបប្រទះផងដែរនៅខេត្តក្រចេះ ដោយរស់ជាតូច ឬ ជាបង្កង - ស្តីក្រោយកម្រិតទឹក ដូចជាស្លឹក ផ្លែ និងដុំថ្ម សត្វល្អិត ពពួកក្តាម និងកំពិល - ពងកូននៅផ្ទះជ្រងង ជាប្រភេទពងអណ្តែត ហើយបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ៣៦ ម៉ោង នៅសីតុណ្ហភាព ២៥-៣០ អង្សាសេ - ប្រវែងវែងបំផុត ៦០ ស.ម ។
១៥		ត្រីកន្ទ្របខ្លា	<i>Dainichthys undecimradiatus</i>	Narrow barred tigerperch	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតាមស្ទឹង បឹងប្រាសាទ និងអាងទឹក ពិសេសក្នុងឆ្នេរស្រែតចំណី - វាស៊ីត្រី កូនសត្វល្អិត ក្តាម កំពិល និងដង្កូវ - ពងកូនពីខែកុម្ភៈ ដល់មីនា ជាប្រភេទពងអណ្តែត - ប្រវែងវែងបំផុត ៤០ ស.ម ។
១៦		ត្រីក្បក	<i>Tenuidosa thibaudaui</i>	Laotian shad	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងតំបន់បឹងទន្លេសាប - ជាប្រភេទត្រីប្រភេទស្រាប ហើយធ្វើការចងក្រងកូននៅមាត់ទន្លេសាបពីខែសីហា ដល់សីហា ហើយច្របូបវិញនៅខែតុលា ឬ វិច្ឆិកា










					<ul style="list-style-type: none"> - ពងកូននៅតំបន់រឹងមន្តសាលាបាយប៉ោយខ្នង ដល់រកា - ប្រវែងវែងបំផុត ៣០ ស.ម។
១៧		ត្រីកញ្ចក់ប្រាំង	<i>Glyptothorax fuscus</i>		<ul style="list-style-type: none"> - រស់ក្នុងតំបន់ទំនេរ ឬ គល់ឈើនៃទន្លេដែលមានបន្ទុក - ហូរខ្លាំងបង្ហូរ ពិសេសក្នុងរដូវប្រាំង និងស្ទឹងត្រែង - ស្បែកស្រទាបប្លែង - រស់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេពីខេត្តស្វាយដំបូង ដល់មឺនា - ប្រវែងវែងបំផុត ១២ ស.ម។
១៨		ត្រីស្លឹក	<i>Wallago leeri</i>		<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតំបន់មេគង្គលើ ជាពិសេសតាមដងទន្លេ - លេងទឹក និងស្រែក - ជាប្រភេទប្រើប្រាស់ជិត - ស្បែក និងកំពស់ជាអាហារ - ពងកូននៅក្នុងទន្លេខេត្តស្វាយដំបូង ដល់ត្បាញ ហើយភាគ - ច្រើនគឺនៅក្នុងខេត្តមឺនា ដោយមំលាក់ពងនៅពេល - យប់ក្នុងតំបន់វាលស្រែលើមឺនា - ប្រវែងវែងបំផុត ១៨០ ស.ម។
១៩		អណ្តើកស្នង់	<i>Heosemys annandali</i>	Yellow-headed temple turtle	<ul style="list-style-type: none"> - មាននៅតំបន់មឺនា ពិសេសបឹងទន្លេសាប ទន្លេ - មេគង្គ និងទន្លេស្រែក (វាលកក់ ព្រៃ តំបន់មឺនា - និង ឬ តំបន់មឺនាប្រាំង) - ប្រវែងវែងបំផុត ១៨០ ស.ម។
២០		អណ្តើកក្រក	<i>Siebenrockiella crassicauda</i>	Black marsh turtle	<ul style="list-style-type: none"> - រស់ក្នុងតំបន់មឺនាសាប ដែលមានបន្ទុកហូរ តិច ឬ - មឺនា (ព្រៃ ព្រៃក ព្រៃស្រក់) - ស្ថានភាពប្រទេស រួមមាន រស់នៅក្នុងតំបន់





២៤		ត្រីឆ្មារក្រពើ	<i>Lycotrhissa crocodilus</i>	Sabertooth thryssa		<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតំបន់ទឹកក្ដៅ ហើយជារឿយៗហែលទឹកនៅតំបន់ទឹកសាប - ដូចប្រទេសនៅក្នុងខាងក្រោមឃ្លាតខាងក្រោម រហូតដល់តំបន់សិប្បកម្មមេគង្គ ទន្លេសាប និងបឹងមេគង្គ - ហើយពេលខ្លះរស់នៅក្នុងអន្លង់ជ្រៅៗនៃទន្លេមេគង្គ - ស្ដីព្យាបាលសត្វល្អិត ក្ដាម កំពស់ និងត្រីតូចៗ - រដូវពងកូននៅចុងរដូវប្រាំង និងដើមរដូវវស្សា - ពិសេស ចម្លែកខ្លះនៅខាងក្រោម ដល់មេសា - ប្រវែងរាងកាយ ៣០ ស.ម ។
២៥		ក្រពើក្រី	<i>Crocodylus siamensis</i>	Siamese crocodile	I	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតំបន់ទឹកសាប ដូចជាទន្លេ មេគង្គ បឹង និងប្រែកតាមដងរំភ័យ - ជាប្រភេទសត្វល្អិតជាអាហារ ពិសេសត្រី - អាចរក ៧ ឆ្នាំ អាចបន្តពូជបាន ដោយបន្តពូជចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ដល់ឧសភា ហើយចាប់តាំងចន្លោះពី ២០ ទៅ ៦០ គ្រាប់/ក្រពើមេ ១ ក្បាល ។
២៦		អណ្ដើកព្រៃ	<i>Malayenyus subtrijugus</i>	Rice-field terrapin		<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតំបន់ទឹកសាប ដូចជាទន្លេ មេគង្គ បឹង និងស្ទឹងដូចជា ដង្កូវ សត្វល្អិតក្នុងទឹក និងត្រីតូចៗ - ចំណីរបស់វា ៦ ទៅ ៨ ប៉ុណ្ណោះ ហើយព្យាបាលក្នុងរយៈពេល ១៦៧ ថ្ងៃ នៅសិប្បកម្មមេគង្គ ២៤ ទៅ ៣០ អង្សាសេ - អាចប្រព្រឹត្តិការណ៍បន្តពូជ ៣ ឆ្នាំ ចំពោះឈ្មោស និង ៥ ឆ្នាំចំពោះស្រី ។





២៧		អណ្តើកឆោម	<i>Heosemys grandis</i>	Asian giant terrapin	II	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅភាគច្រើនក្នុងតំបន់ទឹកសាប - ស្ថិតនៅតាមទន្លេ (ផ្លូវលេខ ១ ក្រុងភ្នំពេញ និងសង្កាត់) - ទំលាក់កូនក្នុងទឹក ៤ ទៅ ៥ គ្រាប់/មេមួយក្បាល ។
២៨		កន្ទុយអណ្តើក	<i>Amyda cartilaginea</i>	Asiatic soft-shell turtle	II	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតំបន់ទឹកសាប តែពេលនៅលើដីត្រូវខ្សោយ - ស្ថិតនៅតាមទន្លេ (សង្កាត់ ក្រុង កំពង់ ខ្យង ត្រី សាង) - រលួយ ផ្លូវលេខ ១ គ្រាប់ចុងក្រុងភ្នំពេញ - រួមទាំងក្នុងទឹក និងទំលាក់កូន ៣ ទៅ ៣០ គ្រាប់/មេមួយក្បាល ។
២៩		កន្ទុយក្បាលកង្កែប	<i>Pelochelys cantorii</i>	Asian giant soft-shell turtle	II	<ul style="list-style-type: none"> - ទើបតែរកឃើញនៅតាមបណ្តោយទន្លេមេគង្គ - ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា - រស់នៅក្នុងអង្គរទឹកជ្រៅជាង ៤០ ម - ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្នុងទឹក ក្នុង កំពង់ រល ។ - បន្តពូជក្នុងខែកុម្ភៈ និងមីនា លើយន្តការកំពង់ ២៨ ទៅ ៣០ គ្រាប់/មេមួយក្បាល - ទំលាក់កូនក្នុងទឹក ៥០ គ.ក្រ និងប្រវែង ២ ម ។
<p>ខ.សមុទ្រ</p> <p>ក្រុមប្រភេទសត្វស្រទាប់</p>						
៣០		ក្រពើសមុទ្រ	<i>Crocodylus porosus</i>	Estuarine crocodile	I	<p>ភាគច្រើនរស់នៅតាមតំបន់មេគង្គ ឬ តាមពាម តំបន់ ប្រទេសកម្ពុជា និងតំបន់វាលភក់</p> <p>ស្ថិតនៅតាមអូរ ដូចជាតាមទន្លេ អណ្តើក ពស់ សត្វ ស្នាប ស្នា ជ្រូក រល ។</p> <p>បន្តពូជនៅក្នុងទឹកស្រា</p> <p>អាយុបន្តពូជ ១០-១២ ឆ្នាំ ចំពោះក្រពើប្តី និង</p>


						<ul style="list-style-type: none">១៦ ឆ្នាំ ចំពោះព្រឹទ្ធសាលក្រពើព្រៃអាចទំលាក់ពងពី ៤០-៩០ គ្រាប់។រស់ក្នុងតំបន់ស្មៅសមុទ្រ ពីសេសក្នុងមេត្តតំបន់ ដែលមានជម្រកកំដៅ ១០ ម.ស៊ីស្មៅសមុទ្រជាអាហារ ដោយពេលពេញវ័យស៊ី ៣០ គ.ក្រ/ថ្ងៃ និងស៊ីសត្វតូចៗក្នុងតំបន់ដងដែររដូវបន្តពូជកើតមានពេញមួយឆ្នាំ ហើយពេញវ័យបន្តពូជនៅចន្លោះ ១០-១៧ ឆ្នាំ ដោយកើតកូនបាន ១ក្បាល រៀងរាល់ ៣ ទៅ ៧ ឆ្នាំ ម្តងពពោះចម្រុះពី ១២ ទៅ ១៤ខែ ហើយទំងន់កូនមើបនឹងកើតពី ២៥ ទៅ ៣៥ គ.ក្រជ្រូកទឹកពេញវ័យមានទំងន់ដល់ ១.០០០ គ.ក្រ។
៣១		ជ្រូកទឹក ឬ ពង្រង	Dugong dugon	Dugong	I	
ក្រុមប្រភេទតំបន់សមុទ្រ៖						
៣២		ត្រីសកប្បក	Cheilinus undulatus	Humphead Wrasse		<ul style="list-style-type: none">ពេលតូចរស់នៅតំបន់ស្មៅសមុទ្រ និងព្រៃកោងកាង ក្បែរតំបន់ផ្តាច់ (ទឹកកក) ហើយពេលចម្រើននៅក្រៅតំបន់ផ្តាច់ (ទឹកជ្រៅជាង)ជាត្រីប្រភេទ និងស៊ីកំប្រមាណមួយ សត្វស្រស់ជាតិ ត្រីសិប្បជាតិ និងសត្វពិតស្នាក់នៅពេញវ័យបន្តពូជចាប់ពីអាយុ ៨ ឆ្នាំឡើងទៅ និងពងកូននៅក្នុងតំបន់ផ្តាច់។





៣៣		បាម្បូនក្របី	<i>Pseudorca crassidens</i>	False killer whale	II	<ul style="list-style-type: none"> - មានរស់នៅក្បែរកោះរុងស្ទឹង - ស្ទើរតែ មិន បង្ហា និងពេញផ្ទៃក្នុងត្រីក - ពេញវ័យបន្តពូជចាប់ពីអាយុ ៨-១១ ឆ្នាំ - ទំងន់អតិបរមាប្រហែល ១.៣៦០ គ.ក្រ ហើយអាយុអតិបរមា ៥៨-៦៣ ឆ្នាំ។
៣៤		បាម្បូនក្បាលធំ	<i>Globicephala macrorhynchus</i>	Short-finned pilot whale	II	<ul style="list-style-type: none"> - ប្រមាណប្រហែលតំបន់ស្ទឹងខ្មែរត្រឹមត្រូវ - ចូលទីតាំងកំណើតពេលយប់ និងពេលព្រឹក ដោយស្មើត្រី និងមីក្នុងបរិមាណ ៤៥ គ.ក្រ / ថ្ងៃ - វាបន្តពូជជាត្រីមក្នុងអាត្រាញី ៨ ឈ្មោល ១ អាយុពេញវ័យបន្តពូជពី ៧-២២ ឆ្នាំ - វាបន្តពូជពេញ ១ ឆ្នាំ ពេញពី ១១- ១៣ ខែ ហើយកូនម្តងបាន ១ ក្បាល - ក្នុងចន្លោះ ៧ ឆ្នាំ ទើបវាមានកូនម្តង ហើយកូនមួយពីរត្រូវបានកូនតែ ៤-៥ ក្បាល។
៣៥		ផ្សោតច្រមុះដបចំពុះខ្លី	<i>Tursiops aduncus</i>	Indo-Pacific bottlenose dolphin		<ul style="list-style-type: none"> - រស់ក្បែរកោះរុង កោះរុងស្ទឹង និងកោះតាង - ស្ទើរពេញត្រី មីក និងបង្ហា - បន្តពូជនៅចុងនាយសង្កាត់ និងដើមដំបូកក្រៅ - ពេញក្នុងរយៈពេល ១២ ខែ ហើយកូនផ្ទុកដោះចេញពីមាត់ម្តាយពី ១៨ ទៅ ២៤ ខែ - ទំងន់ទើបនឹងកើតចេញពី ៩ ទៅ ២១ គ.ក្រ ហើយទំងន់អតិបរមា ២៣០ គ.ក្រ ចំពោះឈ្មោល និង ១៨០ គ.ក្រ ចំពោះស្រី - អាយុកាលអតិបរមា ៤០ ឆ្នាំ។





៣៦		ផ្សិតក្បាលត្រកូក	<i>Orcaella brevirostris</i>	Irrawaddy dolphin	I	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅស្ទើរតែប្រទេសកម្ពុជា និងថៃ - ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា និងថៃ - មិនរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ១០ ទៅ ១២ គ.ក្រ - អាចរស់នៅក្នុងប្រទេស ៣០ ឆ្នាំ ហើយមិនរស់នៅក្នុងប្រទេស ១៣០ គ.ក្រ ។
៣៧		ផ្សិតក្បាលត្រកូក វង់	<i>Tursiops truncatus</i>	Common bottlenose dolphin	II	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងថៃ - ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា និងថៃ - ពេញលេញ ១២ ខែ ហើយក្នុងឆ្នាំមុនមុន - មិនរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ១៤ ទៅ ២០ គ.ក្រ ហើយមិនរស់នៅក្នុងប្រទេស ៥០០ គ.ក្រ មិនរស់នៅក្នុងប្រទេស និង ២៦០ គ.ក្រ មិនរស់នៅក្នុងប្រទេស - អាចរស់នៅក្នុងប្រទេស ៤០ ទៅ ៤៥ ឆ្នាំមិនរស់នៅក្នុងប្រទេស និងមិនរស់នៅក្នុងប្រទេស ៥០ ឆ្នាំ មិនរស់នៅក្នុងប្រទេស
៣៨		ផ្សិតក្បាលត្រកូក	<i>Sousa chinensis</i>	Indo-Pacific hump backed dolphin		<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងថៃ - ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា និងថៃ - ពេញលេញ ១០ ទៅ ១២ ខែ មិនរស់នៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា និងថៃ - មិនរស់នៅក្នុងប្រទេស ១៤ ទៅ ២០ គ.ក្រ ហើយមិនរស់នៅក្នុងប្រទេស ៥០០ គ.ក្រ មិនរស់នៅក្នុងប្រទេស និង ២៦០ គ.ក្រ មិនរស់នៅក្នុងប្រទេស - អាចរស់នៅក្នុងប្រទេស ៤០ ឆ្នាំ មិនរស់នៅក្នុងប្រទេស





៣៩		ផ្សោតឆ្មាំវែក	<i>Stenella longirostris roseiventris</i>	Dwarf spinner dolphin	II	<ul style="list-style-type: none"> - មានរស់នៅក្បែរកោះតាង - ស្ថិតនៅក្នុងត្រី បង្គោល និងមីក - មេពោះក្នុងរយៈពេលប្រហែល ១០ ខែ កន្លះ មើលកើត ហើយចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះក្នុងរន្ធនោះពេលពី ១ ឆ្នាំ ទៅ ២ ឆ្នាំ ។
៤០		ផ្សោតអុច	<i>Stenella attenuata</i>	Pantropical spotted dolphin	II	<ul style="list-style-type: none"> - មានរស់នៅក្បែរកោះតាង និងកោះប៉ូឡូរ៉ៃ - ស្ថិតនៅក្នុង ត្រី បង្គោល និងមីក - អាចផ្តល់កំណើតកូនផ្សោតត្រប់ពេលវេលា - ពេញក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាង ១១ ខែ - មេផ្តល់ទឹកដោះដល់កូនក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចបំផុត ១ ឆ្នាំ និងយ៉ាងយូរបំផុត ២ ឆ្នាំ - អាចរកបានអតិបរមា ៤០ ឆ្នាំ ចំពោះឈ្មោត និង ៤៦ ឆ្នាំ ចំពោះប្រុស ។
៤១		ផ្សោតតតប្រុយខ្នង	<i>Neophocaena phocaenoides</i>	Finless porpoise		<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅក្បែរកោះតាង និងតាមបណ្តោយឆ្នេរនៃខេត្តកោះកុង និងកែប - ស្ថិតនៅក្នុង ត្រី បង្គោល និងមីក - ផ្តល់កំណើតកូននៅទីតាំងផ្សេងៗ និងដើមផ្លូវកៅស៊ូ - ពេញក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ១១ ខែ - មេផ្តល់ទឹកដោះដល់កូនក្នុងរយៈពេល ៧ ខែ - មេផ្តល់ទឹកដោះដល់កូនក្នុងរយៈពេល ៦ ខែ ហើយមិនអតិបរមា ៧.២ ក.ក្រ - អាចរកបានអតិបរមាយ៉ាងតិច ៣៣ ឆ្នាំ ។




៤២		ស្វាតខ្មៅពេជ្រ	<i>Dolphinus capensis tropicalis</i>	Long-beaked common dolphin	I	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅក្បែរកោះរុង និងកោះរុងស្ទឹង - ចំណីរបស់វាមានត្រីតូចៗ និងមីក - ពោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ១១ ខែ ហើយមេផ្តល់ទឹកដោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ១០ ខែ - អាយុកាលអតិបរមាប្រហែល ៤០ ឆ្នាំ។
៤៣		ស្ពឺ	<i>Chelonia mydas</i>	Green turtle	I	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរ ជាពិសេសនៅតំបន់ខ្សាច់ដែលមានស្មៅសមុទ្រ និងសារាយ - ស្ពឺក្លាយជាតិដូចជាស្មៅសមុទ្រ និងសារាយ - ឆ្អឹងមកពងកូននៅតាមកោះដែលមានខ្សាច់ និងដាច់ជ្រលាលើមនុស្ស ចាប់ពីម៉ោង ១១ យប់ក្នុងខែពេញរហូតដល់ខែ ១
៤៤		ក្រាស	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Hawksbill turtle	I	<ul style="list-style-type: none"> - រស់តាមតំបន់ផ្តាច់ និងជួរសំបុកនៅតាមឆ្នេរខ្សាច់ និងនៅតាមកោះដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ - ស៊ីចំរុះ (ស្តង់ ខ្សែសមុទ្រ សិប្បិសត្វ សារាយ) - វាពេញវ័យបន្តពូជពីអាយុ ៣០ ឆ្នាំឡើងទៅ ហើយរយៈពេលពី ២-៣ ឆ្នាំ ទើបពងម្តង។
៤៥		ស្ពឺព្រួញបី ឬ ស្ពឺស្ពឺ	<i>Dermochelys coriacea</i>	Leatherback turtle	I	<ul style="list-style-type: none"> - រស់ក្នុងតំបន់មីក្រូក្រៅ ហើយចូលមករកចំណីនៅក្នុងតំបន់មីក្រាត់ - វាស៊ីខ្សែសមុទ្រ និងសត្វសមុទ្រ - ពងកូននៅតាមតំបន់ឆ្នេរដាច់ជ្រលាលើមនុស្ស និងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់។



៤៦		ស្ទឹងក្បាលធំ	<i>Caretta caretta</i>	Loggerhead turtle	I	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរ ហើយក្នុងរបស់វាចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់ដែលមានក្រដាសឆ្នេរឆ្នេរ - ស៊ីសាច់ជាអាហារ ពីសេសសល់ក្នុងប្រទេសជាតិ ដូចជាស៊ីប្រូស្ត ក្តាម ត្រី និងខ្នុរសមុទ្រ - វាពេញវ័យបន្តពូជចាប់ពីអាយុ ៣០ ឆ្នាំ ឡើងទៅ ហើយវាពេញវ័យចូលក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំម្តង ។
៤៧		ស្ទឹងប្រដេះ	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Olive ridley turtle	I	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរ និងសមុទ្រក្រៅដែលមានជម្រកឆ្នេរ ហើយចូលមកនៅតាមតំបន់ឆ្នេរដែលមានជម្រកឆ្នេរ និងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ស៊ីអាហារចំពោះ ដូចជាក្តាម បង្កង ស៊ីប្រូស្ត សាវាយ និងខ្នុរសមុទ្រ - វាពេញវ័យបន្តពូជចាប់ពីអាយុ ១៧ ឆ្នាំ ឡើងទៅ ហើយពេញវ័យចូលក្នុងរយៈពេល ២ ឬ ៣ ឆ្នាំម្តង ។
៤៨		ត្រៀមក្ប	<i>Tridacna squamosa</i>	Fluted giant tortoise		<ul style="list-style-type: none"> - មានសំបកឥតប្រវែង ៤០ ស.ម - រស់នៅក្នុងជម្រកឆ្នេរលើសពី ២០ ម ដោយការខ្លួនរបស់វាទៅនឹងផ្ទះ - ជាប្រភេទស៊ីច្រោះ និងស្រូបយកសារធាតុសរីរាង្គដែលសាយភាយក្នុងទឹក - បន្តពូជនៅក្នុងរយៈពេលពេញវ័យបន្តពូជ វាមានអាយុចាប់ពី ១ ឆ្នាំ ហើយមកវាមានអាយុខ្លី ដោយមានសរីរាង្គបន្តពូជក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំម្តង ។

៤៩		ត្រួយក្បូរ	<i>Tridacna maxima</i>	Elongate giant clam	II	<ul style="list-style-type: none"> - បានសំបកអតិបរមាប្រវែង ៣៥ ស.ម - រស់នៅក្នុងជម្រកមិនលើសពី ២០ម ដោយក្លាយខ្លួនទៅនឹងថ្ម ឬ ផ្កាថ្ម - វាច្រាយក្នុងក្រុងក្នុងតំបន់អាកាស និងស្រូវយកអុកស៊ីស្តនតាមស្រីក - ពេលពេញវ័យបន្តពូជ វាមានកម្រិតលើសពី ២-៣ ឆ្នាំក្រោយក្លាយជាខ្លឹម - ជាមុន វាបញ្ចេញស្បែកមុនមុនបញ្ចេញពង។
៥០		ត្រួយក្បូរ	<i>Tridacna crocea</i>	Crocus giant clam	II	<ul style="list-style-type: none"> - ជាត្រួយក្បូរតូចជាងត្រួយក្បូរ ត្រឹមតែ ១៥ ស.ម - ខ្លួនរបស់វាមានមូលកប់ចូលទៅក្នុងផ្កាថ្ម - រស់នៅក្នុងជម្រកមិនលើសពី ២០ ម នៅតំបន់ផ្កាថ្មវាល - ពេញវ័យបន្តពូជនៅអាយុពី ៧-៨ ឆ្នាំ ដោយពងកូននៅខាងក្រោម ដល់ថ្ម - ជាប្រភេទត្រីដែលមានការលូតលាស់យឺតយ៉ាវជាងគេ។
៥១		ត្រួយក្បូរ	<i>Tridacna gigas</i>	Giant clam		<ul style="list-style-type: none"> - សំបកអតិបរមាប្រវែង ១៣៧ ស.ម - រស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានមន្ទីរកុមារ ជម្រកមិនលើសពី ២០ ម ពីលើសនៅតំបន់ផ្កាថ្ម - វាបញ្ចេញស្បែកមុនមុនបញ្ចេញពង វាតែងតែចេញដោយបញ្ចេញកាកសំណល់នៅក្នុងសមុទ្រ ភាគច្រើនពងកូននៅខាងក្រោម ដល់កុម្មុះ - មានអាយុវែងរហូតដល់ ៤០ ឆ្នាំ។

៥២		ខ្យងកាដូ	<i>Trochus niloticus</i>	Commercial top		<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតំបន់ផ្ទៃដែលមានជីវាទឹកកក - វាស្វ័យភាពដែលមានសីលធម៌ - ពេញវ័យមានមាត់ ពី ១១ - ១៥ ស.ម - ពេញវ័យមិនមានមាត់ ពី ១០ ម។
៥៣		ខ្យងគុជ ឬ ខ្យង ប្រាក់	<i>Turbo marmoratus</i>	Green turbo or green snail		<ul style="list-style-type: none"> - ពេលគូររស់នៅក្នុងតំបន់ផ្ទៃ ដែលមានជីវាទឹកពី ១ ទៅ ៥ ម និងពេលពេញវ័យរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹក ជ្រៅចាប់ពី ២០ ម - មានមាត់សំបករហូតដល់ ២២ ស.ម។
៥៤		សេះសមុទ្រ (ត្រី)	<i>Hippocampus</i> spp.	Sea horse	II	<ul style="list-style-type: none"> - រស់នៅតំបន់សមុទ្រ ល្បាប់ខ្យង ដែលមុខ ពីសេសនៅជុំវិញកោះរុង និងរុងស្អាត - វាស្វ័យភាពសត្វសត្វដ៏តិចតួច និងតូចត្រី - អាយុ ១៤ សប្តាហ៍អាចបង្កពូជបាន - វាបង្កពូជរៀងរាល់ ២០-២៥ ថ្ងៃ ពេញម្សៅ - សេះសមុទ្រឈ្មោលជាអ្នកពពោះ ហើយរយៈពេល ២០ ដល់ ២៨ ថ្ងៃ ទើបញ្ចេញ - ជាទូទៅ ក្នុងពេលមានភិក្ខុដង្កូវ សេះសមុទ្រឈ្មោល កើតបានកូន ១០០-២០០ ក្បាល។
៥៥		ផ្កាផ្លែ	<i>Anthozoa</i> spp.	Corals and sea anemone		<ul style="list-style-type: none"> - ជុំវិញកោះ ចាប់ពីជ្រុង ដល់ជ្រៅ ៣ ស.ម - វាស្វ័យភាពនៅជុំវិញកោះរុង កោះរុងស្អាត កោះ ប្រេម និងកោះផ្សេងៗទៀត - មានមាត់សំបកប្រមាណ ២.៨០០ ហិកតា ជាង ៧០ ប្រភេទ ចែកជា ២ក្រុម (ផ្កាផ្លែ និងមន្ទីរ) - អាចប្តូរសំបកប្រមាណ ១-២ ស.ម/ឆ្នាំ។

៥៦		ប្រឡងកាស	<i>Tachypleus gigas</i>	Trangular-tail horseshoe crab	<ul style="list-style-type: none"> - រស់ក្នុងសំបកសមុទ្រ ហើយបង្ការទឹកកកបង្កើន - ដើម្បីធ្វើសំបកសមុទ្រ - វាស្ថិត បង្កា និងត្រីជាអាហារ - ព្យួរពេញវិញបន្តបន្ទាប់ពីស្លាប់ប្រវែង ៩៨ ម.ម និង ឈ្មោលមានប្រវែង ១១១ ម.ម - ឈ្មោលសក ១២ ដង និងស្រីសក ១៣ ដង មើល ពេញវិញបន្តបន្ទាប់ - សកម្មភាពបន្តបន្ទាប់មានពេញមួយឆ្នាំ។
៥៧		កាស	<i>Carcinoscorpius rotundicauda</i>	Mangrove horseshoe crab	<ul style="list-style-type: none"> - មានប្រវែងរាងសក់ ៤០ ស.ម (ទាំងក្រណាត់) - ស្ទើរដូច និងស្ទើរប្រដាប់ដាច់ខាត - អាចរស់នៅពី ៦០.០០០-១២០.០០០ គ្រាប់ នៅ លើខ្សាច់ និងឈ្មោលក្រោយ ២ សប្តាហ៍ - វាពេញវិញបន្តបន្ទាប់ពីអាយុ ១១ ឆ្នាំ។
៥៨		ត្រីឈាមក្រហម	<i>Rhincodon typus</i>	Whale shark	<ul style="list-style-type: none"> - ភាគច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់ទឹកជ្រៅ - វាស្ថិតបង្កា (ត្រី) មីក និងត្រីត្រី - ពេញវិញបន្តបន្ទាប់ពេលមានប្រវែងសក់ ៦ ម - វាមានអាយុវែងបំផុតពី ១០០-១៥០ ឆ្នាំ។

បានបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ៩៩១១